

میلاد ۳ بیرجند

انستیتو تخصصی سلامت
ملاهی شب آرزوی سلامت



داروهای مصرفی در

بیماران دیالیزی چیست؟



آدرس: بیرجند - جاده اندلی

تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۳۳۳۳ / ۰۳۱-۳۳۳۳۳۳۳
تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۳۳۳۳
www.milad3.ir

واحد پیوند کیفیت | تلفن: ۰۳۱-۳۳۳۳۳۳۳

جهت جلوگیری از کمبود آهن در آقایان ۱۰ میلی گرم هر روز و در خانمها ۱۵ - ۱۰ میلی گرم هر روز

جهت درمان کمبود آهن:

مقدار مصرف دارو با توجه به شدت کمبود آهن توسط پزشک تعیین می گردد.

شرایط نگهداری دارو:

- ۱) دارو را دور از نور و رطوبت در دمای زیر ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد درین ظروف کاملاً در بسته نگهداری نمایید.
 - ۲) دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 - ۳) از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.
- مواد منع مصرف: هپرو کلسمین - فسمومیت - هپیر

تداخلات:

هورمون: تیروی، استروئید، استروال، خصامیت نسبت به دارو، سوزش و درد معده، کبیر رنگ دندان (در مصرف خوراکی) و آسیب معده تریپول.

توجهات پزشکی و پرستاری:

۱. مراقب بروز هیپوکلسمین به ویژه در مبتلایان به اختلال کلیوی باشید.
۲. با هدف اصلاح کلسیم دارو یک ساعت بعد از غذا و با هدف اصلاح فسفر، وسط غذا میل گردد.

فروس سولفات:

فروس سولفات با فرمول (FeSO4) موجب جبران کمبود احتمالی آهن برای ساخت هم جهت گلبولهای فرس خون می شود. این ماده در ترکیب با مواد زیندی مانند ویتامین سی، اسید فولیک و فولک ویتامین و ... نیز تولید شده است.

موارد مصرف: فرس سولفات در درمان و پیشگیری از کم خونی فقر آهن به کار می رود.

میزان مصرف: مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمولی این دارو به شرح زیر است:

دوز معمول بزرگسالان:

داروهای مصرفی در بیماران دیابتی:

کلسی تریول (Calcitriol) نام تجاری (rocaltrol)

روکاتریول قویترین شکل ویتامین دی ۳ می باشد که در

کلیه ها تولید می شود و در بیماران دیابتی باید از طریق

تزیق دریافت گردد. این دارو بواسطه جذب روده ای و

احتباس کلیوی سطوح سرمی کلسیم را بالا می برد.

موارد مصرف: درمان هیپوکلسیمی - بیماران تحت دیالیز

مزمن

میزان مصرف: روزانه یک عدد قرص 250 میلی گرمی از

طریق خوراکی تجویز می شود.

موارد منع مصرف: هیپرکلسیمی - نسمومیت - هیپر

کلسیمی

عوارض: هیپرکلسیمی - خواب آلودگی - سردرد - تهوع -

تاری دید - بی اشتهاگی - تهوع - یبوست - پیش قلب

جراخیت پرستاری:

1. کنترل کلسیم و فسفر و توصیه ها آموزشی بصورت

موره ای انجام گردد.

2. دارو نور از نور و حرارت نگهداری شود.

اسید فولیک:

نام تجاری - POLACIN

موارد مصرف: در بیماران انمی منگال پلاستیک - تولید

گلبول قرمز - جهت خون سازی رنگار برده می شود.

عوارض جانبی: ندارد

تشابه های کمبود اسید فولیک: التهاب زبان - اسهال -

یبوست - کاهش وزن - تحریک پذیری - رنگ پریدگی -

فراموشی

گرفتگی کلسیم:

دسته دارویی - درهانی از املاح کلسیم، کاهش دهنده

فسفات سرمی، آنتی اسید ترکیبات کلسی کلسیم

اندوکسینون مصرفی در هیپر فسفاتی ناشی از CRP در

صورتی که وسط غذا خوردن شود. به عنوان آنتی اسید در

بیماری های پینیکه درمان هیپو کلسیمی ازمان مصرف با

غذا فاصله ندارد) و استنویرون.

گرفتگی کلسیم فر کید با فسفر موجود در غذا ترکیب شده

و از جذب آن فر ورود به جریان خون جلوگیری می کند.

این قرص در ابتدا و یا بین غذا داده می شود و در صورت

فسفر بالای 2.0-2.5 از آملوژل استفاده می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط: هیپوکلسیمی و یبوست شدید و

تهوع

تداخل دارویی:

1. آنتی بیوتیک ها، غیرانتوتین، آهن،

ایزونیازیدوسالسیلات ها جذب خوراکی گرفتگی کلسیم را

دچار مشکل می کند و باید با فاصله زمانی از هم مصرف

شود.

2. نسمومیت و درمان مصرف بیش از اندازه کلسیم ممکن

است به هیپر کلسیمی منجر شود. در موارد شدید هیپر

کلسیمی، مصرف کلسیم را قطع و از نمودالیز کمک می

گیرند.