

## میلا دیم بیرجند

اصطلاحات تخصصی سلامت  
 سلامتی شما از روی سلامت



## فاو پیسم

آبچینه که در آنست که در اندام  
 کولکوس، سوزش از روی پسته که  
 طارو سینه را تقویت می نماید



آدرس: بیرجند - جاده امامی

تلفن: 031-337111 / 031-3372222

تلفن: 031-337111

www.miladim.com

واحد پیوسته کیفیت | تلفن: 031-337111

- 11- پس از گذشت ۲ ماه می توانید مجدداً از کودک خود آزمایش قاروسم بطلب کنید.
- 12- هر چند خطر عارضه ی قاروسم پس از ۱۰ سالگی کاهش می یابد اما بهتر است همیشه مراقب او باشید.
- 14- توصیه می شود گنه برای فرزندان دیگر خود نیز آزمایش تشخیص قاروسم انجام دهید.

- 8- بعضی از داروهای گیاهی مانند گل بنفشه که کاهش از جوشانده آن برای دل درد کودگان استفاده می شود می تواند در این بیماران مفلکوم شدید ایجاد کند لذا بهتر است از مصرف داروهای گیاهی و محلی بدون نظر پزشک محارب خودداری کرد.
- 9- در اثبات ویا محصل زندگی او از اسیری های جاسوس کشش بنا نظر و ادکلن استفاده نکنید.
- 10- برای تسکین درد بنا پایین آسمن تب هرگز از آسپرین (ASA) استفاده نکنید و برای کاهش تب او را باشوبه کنید یا از استامینوفن به مقداری که دکتر تجویز کرده استفاده کنید.
- 9- بدون مشورت پزشک هرگز به او دارو ندهید.
- 10- فرزند شما هرگز نباید خون خود را به دیگران اهدا کند.
- 11- در صورت بروز تشنگی های شب ، رنگ پریدگی ، استراحت بنا تقییس رنگ افرار در کودک خود را پزشک را در جریان قرار دهید.

فازوسیم یا بافلایسی پنک بیماری ارثی است که به خاطر کمبود ماده ای در گلبول قرمز هیپو (HbF) به دلیل نقص پروتئین یا ماده سفید شدن به پوست بدن کودک شما عوارض ظاهر گردد این بیماری عمدتاً در کودکان و در جنس مذکر ظاهر می گردد. با کمبود این آنزیم (HbF) در صورت بروز عوارض خاصیتی به بدن گلبول های قرمز تغییر شده و در کودک مظهر به رنگ برهنگی، زردی چشم و گاهی پوست تغییر رنگ افراز به سیاه یا قرمز، بی حالی یا تب می شود. در دوره ای نوزادی، زردی شدید و کم خویش معمولاً تنها نشانه ای این عارضه است که ممکن است منجر به نوبت خون نوزاد شود اما در سنین بالا اثر از چند ساعت تا یکی دو روز پس از تماس - کودک رنگ پروده و زرد شود. به دلیل آن ممکن است دچار تب یا استفراغ شود. در این هنگام اثر از به رنگ چای در می آید، اگر چه ممکن است این نشانه ها به طور خفیف هم ظاهر شود اما گاهی چنان شدید هستند که کودک شما نیازمند درمان فوری و دریافت خون خواهد بود. عدم مراجعه فوری به پزشک متخصص ممکن است باعث بروز عوارض جدی و خطرناک گردد.

دلایل عمده تغییر در گلبول های قرمز در این بیماری عبارتند از:

- 1- عفونت
- 2- عوارض و مواد شیمیایی مثل فنتانین و پترو کاش ها
- 3- عفونت ها مثل سرماخوردگی یا موارد مشابه آن.
- 4- باورین از آن جایی که بروز عوارض فزوسیم می تواند برای فرزندتان خطرناک تر باشد از شما والدین گرامی خواهشمندیم به نشانه های زیر با دقت توجه فرمایید:
  - 1- اگر سفیدی هستید که به کودکان شیر می دهید هرگز باغلا و آسیرین نخورید و در مورد صورتن هر دارویی نیز با پزشک مشورت کنید.
  - 2- کبودگی از صورتن و پوسیدن باغلا به هر صورت که باشد (آزاد خشک شده، بیخ زده، خام و پخته) خودداری کند. در اوایل فصل بهار که باغلا تازه به بازار می آید بسیار مراقب، با او باشید. شاید موقعیت خاصی پیش بیاید که کودک شما باغلا را به صورت اتفاقی بخورد و هیچ عارضه ای پیش نیاید اما به این پیش آمدها هرگز دل خوش نکنید. خطر واکنش نامطلوب همیشه وجود دارد و باید تا آخر عمر از خوردن باغلا پرهیز کند.
  - 3- فرزندتان از خوردن سبزیجات رنگ و پستی از حد خودداری کند.
  - 4- مراقب باشید که حتی سوی نشانه نیز به مشام او نرسد (گوشه یا کافهای نشانه هر دو می تواند خطرناک باشد).
  - 5- در هنگام مراجعه به پزشکان مختلف لیست داروهایی که کودک شما نباید از آن سوء استفاده کند به همراه داشته باشید.

- فتازوپردین
- ASA (آسپرین)
- متیل هیدرازین
- سولفامید
- نفتالین
- بنزین
- داروهای ضد مالاریا
- فتاسلین
- ویتامین A
- متیلن بلو
- پروپناید
- کو تریموکسازول
- تالیدینک اسید
- کلر امفینیکل
- کلرا فنلوانین
- پیرمالین
- پاماستین
- کلروکین